

Qué hacer si una persona es sintomática



Estas recomendaciones son para las escuelas K-12, las guarderías y las actividades extraescolares relacionadas.

Si una persona tiene uno o más de estos síntomas:

- Fiebre ($\geq 100.4^{\circ}\text{F}$) o escalofríos
- Falta de aire o dificultad para respirar
- Dolores musculares o corporales
- Pérdida nueva del gusto o del olfato
- Tos (nueva, cambiada o empeorando)



Debe aislarse en casa **Y** hacerse la prueba de COVID-19

Si no recibe el nombre de un diagnóstico alternativo de un proveedor de atención médica **O** si no se hace la prueba



Da **POSITIVO** para COVID-19



Da **NEGATIVO** para COVID-19 **O** recibe el nombre de un diagnóstico alternativo de un proveedor de atención médica más una prueba negativa

- Congestión o secreción nasal
- Náusea, vómito o diarrea
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Dolor de garganta



Debe aislarse en casa

¿Tuvo **sólo UN** síntoma?

NO

SÍ

¿Los síntomas se resolvieron dentro de 24 horas **O** son consistentes para una enfermedad crónica diagnosticada?

NO

SÍ

Aislarse en casa

Pueden regresar a la escuela, a la guardería y a las actividades después de que hayan pasado 5 días desde que aparecieron los primeros síntomas si:

1. No tiene fiebre en las últimas 24 horas (sin medicación) **Y**
2. Los síntomas han mejorado significativamente **Y**
3. Llevan una mascarilla cuando están cerca de otras personas durante los días 6 a 10 **O** dan negativo en una prueba de antígeno para volver sin mascarilla

Si no pueden llevar mascarilla y no dan negativo después del quinto día, deben seguir aislados hasta el décimo día.

Vuelva a la escuela, a la guardería y a las actividades si:

1. No tiene fiebre en las últimas 24 horas (sin medicación) **Y**
2. Los síntomas han mejorado significativamente

Qué hacer si recibe una Notificación de exposición o es identificado como un contacto cercano*



Estas recomendaciones son para las escuelas K-12, las guarderías y las actividades extraescolares relacionadas.

Independientemente del estado de vacunación, se recomiendan las siguientes directrices:

- ❑ Seguir asistiendo a la escuela, a la guardería y a las actividades.
- ❑ Observar si hay síntomas durante 10 días después de la exposición.
- ❑ Considerar el uso de una máscara bien ajustada durante 10 días después de la exposición.
- ❑ Considere hacerse la prueba entre tres y cinco días después de la exposición.

